

登革熱症狀勿輕忽

就醫通報不延誤



外出記得噴防蚊液。



好！

- 1 前往登革熱流行地區可**穿著輕薄淺色長袖衣褲**，塗抹經衛生福利部許可之防蚊液。
- 2 返國後：回國後2週內持續做好個人防蚊措施、**1個月內暫緩捐血**。

自我防護



應盡速就醫

主動告知醫生本市疫區活動史及東南亞國家旅遊史。

臨床症狀





隨手清容器 孑孓不孳生



廁所馬桶

巡
經常巡檢

倒
倒除積水

清
環境清理

刷
刷洗容器



水溝/陰井



帆布

- 1 結合防疫地圖，分區分工**定期巡檢**，雨後**加強巡檢頻率**。
- 2 留意住家環境，**清除積水**，避免孳生病媒蚊。
- 3 查獲陽性孳生源依傳染病防治法處**新臺幣3,000元以上1萬5,000元以下罰鍰**。



掃地用具




水桶



冷卻水塔



工地



樹洞



廢棄輪胎

滅蚊四招學起來~

雨後加強孳清

登革熱孳孳！

讓病媒蚊絕跡



巡

積水容器、水溝

倒

容器倒置

清

清除積水、不要的容器

刷

刷掉蟲卵

